



कृषकको लागी तथ्य पत्र

नं. ०२ असार २०८०

मकैको ध्वाँसे थेग्ले रोग

परिचय :

मकै बालीमा लाग्ने ध्वाँसे थेग्ले रोग (Gray Leaf Spot) एक प्रकारको दुसीजन्य रोग हो । यो सर्कोस्पोरा जिया मेडिस (Cercospora zea-maydis) नामक दुसीको कारण लाग्दछ । यो जीवाणुले मकैबालीमा मात्र आक्रमण गर्दछ । नेपालमा सर्वप्रथम वि.सं. २०६३ सालमा काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको दुखर्क गा.वि.स. बाट यो रोगको पहिचान भएको थियो । यो रोग मध्य तथा उच्च पहाडी भेग (१४००-२००० मिटर) मा प्रकोपको रूपमा देखा पर्ने गर्दछ र यसले ६०-९५% सम्म उत्पादनमा ह्रास गरेको पाईन्छ ।

प्रमुख लक्षणहरू

- » सुरुमा दुसीले फेद नजिकको पातमा आक्रमण गरी स-साना पहेंला वा खैरा दागहरू बनाउँदछ र २ देखि ३ हप्ता भित्र पातको नशासँग समानान्तर लाम्बिला धर्सा वा थेगलाहरूमा परिणत हुन्छन् । यिनीहरू किनारा नभएका पहेंला चतुर्भुज आकारमा लस्करै देखिन्छन् (चित्र नं. १) ।
- » चित्र नं २ मा देखाए जस्तै थेगलाहरू एक आपसमा जोडिएर पात पुरै ध्वाँसे रंगमा बदलिई डड्छन् ।
- » यो रोगले घोगाको खोस्टामा पनि आक्रमण गरी पातको जस्तै लक्षण देखाउछ (चित्र नं ३) भने बोटको डाँठमा गाढा खैरा रंगका ठूला लाम्बिला वा साना बाटुला आकारका दागहरू देखिन्छन् ।

» घोगाहरू साना, हलुका, थोते र टेढा पनि हुने गर्दछन् ।

श्रोत तथा फैलिने अवस्था:

रोगको दुसी बीउबाट सर्दैन । माटोमा गल्ल नसकेका रोगी बोटका भागहरू जस्तै: डाँठ, पात, पातको फेद, घोगाको खोस्टा आदि रोग फैलाउने पहिलो स्रोत हुन् । यो रोग बढ्नेको लागी तापक्रम २३-३५ डिग्री सेन्टिग्रेड र सापेक्षिक आर्द्रता ९०% हुनुपर्दछ । बीउ बाक्लो गरी छर्ने, खेतबारीमा हावा कम खेल्न पाउनु र सिधा घाम नपर्नु, मलखाद सिफारिस मात्रामा प्रयोग नगर्नु, पानी निकासको व्यवस्था नहुनु आदि कारणले पनि यो रोगको प्रकोप बढ्न सहयोग गर्दछ ।

व्यवस्थापनका उपायहरू

- » रोग अवरोधक जातहरू जस्तै: गणेश-१, मनकामना-१, मनकामना-३, मनकामना-६, देउती लगाउने ।
- » रोगले ग्रस्त भएका बोट तथा विभिन्न अवशेषहरू एकै ठाउँमा थुपारी जलाईदिने ।
- » मकै छिटो रोप्ने (फागुन महिनाभित्र) जसले गर्दा रोग लागीहाले पनि उत्पादनमा खासै असर पर्दैन ।
- » मलखादको सिफारिस मात्रा प्रयोग गर्ने र कम्तीमा २ वर्षसम्म घुम्ती बालीको रूपमा धान, गहुँ, सिमी, भटमास, आलु, जौ, तरकारी लगाउने ।
- » रोग देखा पर्ने वित्तिकै कार्बेन्डाजिम ५०% डब्लु.पी. वा म्यानकोजेब ७५% डब्लु.पी. वा म्यानकोजेब ६३%+कार्बेन्डाजिम १२% डब्लु.पी. २ ग्राम प्रति लि. पानीमा मिसाई छर्ने ।



चित्र नं. १: मकैको पातमा ध्वाँसे थेग्ले रोगको लक्षण - सुरुको अवस्था (दायाँ)

र पहिचानात्मक लक्षण (बायाँ)

श्रोत: <https://cropprotectionnetwork.org>

चित्र नं. २: रोगले मकैको पात डडेको

श्रोत: <https://cropprotectionnetwork.org>

चित्र नं. ३: मकैको घोगाको खोस्टामा रोगको लक्षण

श्रोत: <https://cropprotectionnetwork.org>

नोट: जीवनाशक विषादीको पर्सनु पर्ने अवधिलाई मध्यनजर गरि सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाएर मात्र विषादीको प्रयोग गरौं ।

तयारकर्ता:
विवेक सुनार
बाली संरक्षण अधिकृत



नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्थी विकास मन्त्रालय
कृषि विभाग
केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला
हरिहरमवन, ललितपुर

सम्पादन:
राजिवदास राजमण्डारी
वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत