



कृषकको लागि तथ्य पत्र

नं. ०९ असार २०८०

सेतो भिँगा (Whitefly)



परिचय :

सेतोभिँगा (*Bemisia tabaci*) एक बहुभक्षि कीरा हो जसले धेरै बालीहरूलाई आक्रमण गर्दछ। यस कीराले मुख्य रूपमा क्षति गर्ने बालीहरू २० भन्दा बढि छन् जसमध्ये कपास, गोलभेडा, आलु, सखरखण्ड, काउली वर्ग, लहरे बाली (फर्सी, काँक्रो आदि), बोडि, भण्टा, सुर्ती, एभोकाडो, अगुर, अम्बा, सुर्यमुखि आदि हुन भने यसको आश्रयदाता विरुवाहरू ३५० भन्दा बढि छन्।

पहिचान, अनुगमन तथा क्षतिको प्रकार

- » यस कीराको फुल करिब ०.१ देखि ०.२ मि.मि. को हुन्छ। सुरुमा फलको रङ्ग सेतो हुन्छ तर परिपक्व भएपछि हल्का सुन्तलाहुँदै गाढा सुन्तला रङ्गमा परिणत हुन्छ।
- » यस कीराको लार्वा करिब ०.३ देखि ०.६ मि.मि. को हुन्छ। फुलबाट निस्कनेको पहिलो अवस्थाको लार्वालाई क्रलर भनिन्छ र यो चलायमान हुन्छ। यो हिडेर तल्लो पातको उपयुक्त सतहमा काचुली फेरेर एकै ठाउँमा बसी निम्फल अवस्था व्यतित गर्दछ।
- » प्युपाबाट वयस्क निस्कने बित्तिकै पखेटा फिजाउछ र यसको पेटमा भएको ग्रन्थिबाट मैन जस्तो सेतो पदार्थ निकाली पखेटा ढाक्दछ। यसको वयस्क करिब १ मि.मि. लामो हुन्छ।
- » यस कीराको संख्या प्रति पात ५ देखि १० सम्म भएमा नियन्त्रणका उपायहरू अपनाउनु पर्दछ।
- » सेतो भिँगाले धेरै भाइरस रोगहरू सार्ने गर्दछ।

- » संक्रमित बालीहरूमा नशा पहेँलिन, पात पहेँलो हुने, पातको एल्लो ब्लोचिङ्ग, एल्लो मोजाइक भाइरस, लीफ कर्ल, प्लान्ट स्टन्टिङ्ग आदि लक्षणहरू देखिन सक्छ।

व्यवस्थापनका उपायहरू

- » भारपात हटाई खनजोत गर्ने। भारपात यस कीराको श्रोत हुन सक्छ।
- » शिकारी कीराहरू जस्तै जालीदार पखेटा भएको कीरा, स्त्री स्वभावका सात थोप्ले लगायतका कीराहरूले यस सेतो भिँगा कीरालाई आफ्नो आहार बनाउदछ।
- » यदि प्लास्टिक घर भित्र यस कीराको संख्या धेरै भएमा सबै बिरुवाहरू हटाई कम्तिमा दुई हप्तासम्म खाली राख्ने र बाहिरबाट सेता भिँगा भित्र नछिँने बन्दोबस्त मिलाउने।
- » पानीको फोहराले पनि यस कीराको वयस्कलाई भार्न मद्दत गर्छ।
- » पहेँलो टासिँने पासोको प्रयोग (१२ वटा प्रति हेक्टर) गर्नु पर्दछ।
- » जैविक विषादी भर्तिसिलियम लेकानी १.१५% डब्ल्यू.पी. ५ ग्राम प्रति लिटर पानीका दरले प्रयोग गर्ने।
- » एजाडिरेक्टिन ०.०३% इ.सी. ५ मि.लि. प्रति लिटर पानी वा इमिडाक्लोप्रिड १७.८ एस.एल. १ मि.लि. प्रति ४ लिटर पानी वा एसिटामिप्रिड २०% एस.सी. १ ग्राम प्रति ८-१० लिटर पानी वा फ्लोनिक्वामिड ५०% डब्ल्यू.जी. १ ग्राम ३ लिटर पानीमा मिसाइ प्रयोग गर्ने।



चित्र १: सेता भिँगाको फुलहरू
श्रोत: <https://extensionentomology.tamu.edu>



चित्र २: वयस्क सेता भिँगा र निम्फ
श्रोत: Michael J. Raupp, Ph.D.



चित्र ३: गोलभेडाको फलमा सेतो भिँगाको वयस्क
श्रोत: सुनिल अर्याल, नार्क



चित्र ४: भण्टाको पातमा सेतो भिँगाको वयस्क
श्रोत: <http://ephytia.inra.fr/en/C/5133/ Tomato-Whiteflies>

नोट: जीवनाशक विषादीको पर्सनु पर्ने अवधिलाई मध्यनजर गरि सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाएर मात्र विषादीको प्रयोग गरौं।

तयारकर्ता:
सिर्जना श्रेष्ठ
बाली संरक्षण अधिकृत



नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्थी विकास मन्त्रालय
कृषि विभाग
केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला
हरिहरमवन, ललितपुर

सम्पादन:
राजिवदास राजमण्डारी
वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत